

INFORMACJA DLA PACJENTA

Instrukcja pobierania moczu ze środkowego strumienia u niemowląt i małych dzieci.

- Rozebrać dziecko do pasa w dół w ciepłym pomieszczeniu (najlepiej rano po karmieniu).
- Osoba pobierająca mocz musi dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, a następnie osuszyć je jednorazowym ręcznikiem.
- Rozchylić nóżki dziecka, dokładnie umyć okolice cewki moczowej, sromu i odbytu(zawsze do tyłu), także fałdy skórne czterokrotnie zmieniającymi gazikami.
- Osuszyć jednorazowym ręcznikiem od przodu ku tyłowi.
- Przygotować sterylny pojemnik.
- Jeżeli to możliwe postarać się aby dziecko oddało mocz bezpośrednio do jałowego pojemnika, przepuszczając pierwszą niewielką porcję moczu w celu „wypłukania” cewki moczowej z bakterii i nabłonków.
- W przypadku niemowląt unieść niemowlę w górę i masować mięśnie grzbietu wzdłuż kręgosłupa ku tyłowi.
- Z chwilą rozpoczęcia oddawania moczu postawić przygotowany jałowy pojemnik, przepuszczając (np. na pieluszkę) pierwszą porcję moczu – pobrać ok. 5 ml