

## INFORMACJA DLA PACJENTA

### **Instrukcja pobierania płwociny**

Uwaga: Należy pobrać płwocinę, nie ślinę (materiał powinien mieć charakter śluzowo -ropny, ropno - krwawy lub ropny).

*W przypadku trudności z odkrztuszaniem i uzyskaniem odpowiedniego materiału, należy 1 -2 dni przed pobraniem stosować u pacjenta środki wykrztuśne.*

- Odkrztusić rano po przebudzeniu, na czczo (głęboki kaszel ułatwia oddanie właściwego materiału), po uprzednim umyciu zębów i po wypłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą (pacjenci posiadający protezę zębową muszą ją usunąć przed płukaniem).
- Pojemnik należy odpakować bezpośrednio przed oddaniem materiału, odkręcić nakrętkę i trzymać pojemnik nie dotykając wewnętrznych powierzchni.
- Płwocinę należy odkrztusić bezpośrednio do pojemnika (ok. 3ml).
- Ostrożnie zakręcić pojemnik.
- Opisać pojemnik: imię, nazwisko, materiał, data i godzinę pobrania
- Dostarczyć do badania w ciągu 2 godzin od pobrania, do czasu dostarczenia przechowywać w temperaturze pokojowej.