

**SKIEROWANIE DO PRACOWNI TOKSYKOLOGII ZDL
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
BADANIA TOKSYKOLOGICZNE**



Szczegółowe informacje dotyczące pobierania materiału do badań wykonywanych w Pracowni Toksykologii oraz skierowania w wersji elektronicznej są na stronie internetowej <https://tiny.pl/wpsch>

Pieczętka zakładu zlecającego

Pieczętka i podpis lekarza zlecającego

Adres e-mail odbiorcy wyniku

Numer telefonu lekarza zlecającego

DANE PACJENTA**Nazwisko****Imię****PESEL****Płeć**

K

M

W przypadku
braku numeru
PESELNazwa
dokumentu
tożsamościNumer i seria
dokumentu
tożsamościData
urodzenia**ZLECONE BADANIA****KREW****MOCZ**

HEPARYNA

☐ Lotne Związki Organiczne:
Metanol, Etanol, Izopropanol, Aceton☐ Lotne Związki Organiczne:
Metanol, Etanol, izopropanol, Aceton☐ Glikole:
Etylenowy i Propylenowy☐ Karboksyhemoglobina☐ Chlorprotiksen☐ Atropina i skopolamina☐ Methemoglobina☐ Fenotiazyny☐ Baklofen☐ AChE krwinkowa

Substancje uzależniające w moczu

SKRZEP

☐ Glikole:
Etylenowy i Propylenowy☐ 10-parametrowy test
przesiewowy (składowe testu
wymienione poniżej)☐ 20-parametrowy test
przesiewowy (składowe zawarte
w teście 10-parametr. oraz poniżej)☐ Paracetamol☐ Amfetamina/metamfetamina☐ Buprenorfina☐ Salicylany☐ Opiaty☐ Fencyklidyna☐ Kwas walproinowy☐ THC☐ Fentanyl☐ Karbamazepina☐ Kokaina (metabolit)☐ Ketamina☐ Lit☐ LSD☐ Mefedron☐ Lamotrygina☐ Ekstazy☐ Oksykodon☐ Lewetyracetam☐ Metadon☐ Pregabalina☐ Fenobarbital☐ Barbiturany☐ Tramal☐ Digoksyna☐ Benzodiazepiny☐ Zolpidem☐ Teofilina☐ Trójcykliczne antydepresanty☐ Zopiklon

Objawy, wywiad, uwagi:

Rodzaj materiału biologicznego

Data
pobraniaGodzina
pobrania

Imię i nazwisko osoby pobierającej

☐ Krew
na
skrzep☐ Krew
na
heparynę☐ Mocz

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
ZDL Pracownia Toksykologii
Czynna całą dobę
tel. 56 679 35 94
fax 56 679 35 90
kom. 667 420 550
87-100 Toruń
ul. Konstytucji 3 Maja 42

Data i godz.
przyjęcia mat.Podpis osoby
przyjmującejNumer
analizy

Kod kreskowy

Wynik badania przekazano

WYPEŁNIA: LEKARZ

POBIERAJĄCY

LABORATORIUM

**SKIEROWANIE DO PRACOWNI TOKSYKOLOGII ZDL
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
BADANIA TOKSYKOLOGICZNE**



Szczegółowe informacje dotyczące pobierania materiału do badań wykonywanych w Pracowni Toksykologii oraz skierowania w wersji elektronicznej są na stronie internetowej <https://tiny.pl/wpsch>

DANE PACJENTA (ciąg dalszy)

Adres zamieszkania					
Numer telefonu		Adres e-mail		Data i podpis	

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

Nazwisko		Imię											
PESEL	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td> </tr> </table>											Data i podpis	
Adres zamieszkania													

OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU WYNIKÓW

Nazwisko		Imię	
-----------------	--	-------------	--

NAJWAŻNIEJSZE UWAGI DOTYCZĄCE POBIERANIA MATERIAŁU

**MATERIAŁ POBRAĆ JAK NAJSZYBCIEJ OD PRZYJĘCIA DO SZPITALA,
W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZED WDROŻENIEM LECZENIA.**

NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ZLECONYCH BADAŃ ZALECA SIĘ POBRANIE PONIŻSZEGO ZESTAWU:

- Ok. 10 mL krwi do probówki na skrzep, nie stosować probówek z separatorem żelowym.
- Ok. 5 mL krwi do probówki zawierającej antykoagulant (wysuszoną heparynę).
- 50 do 100 mL moczu.

Lotne związki organiczne (metanol, etanol, izopropanol, aceton) we krwi	- Substancje lotne: używać szczelnie zamkniętych probówek. - Dezynfekować skórę środkami nie zawierającymi alkoholu.
Glikol etylenowy i propylenowy w surowicy	
Lotne związki organiczne (metanol, etanol, izopropanol, aceton) w moczu	Substancje lotne: używać szczelnie zamkniętych pojemników.
Glikol etylenowy i propylenowy w moczu	
Paracetamol (Acetaminofen) w surowicy	- W przypadku podejrzenia przedawkowania przez jednokrotne przyjęcie dużej dawki leku krew pobrać nie wcześniej niż po 4 godzinach od zażycia. - Na zleceniu należy podać ile godzin minęło od zażycia leku do pobrania krwi. - W przypadku braku możliwości uzyskania powyższej informacji lub gdy lek był przyjmowany wielokrotnie krew pobrać natychmiast.
Walproinowy kwas w surowicy	Krew zhemolizowana nie nadaje się do badania.
Lit w surowicy	- W przypadku transportu trwającego > 4 godzin krew odwirować i oddzielić surowicę od krwinek. - Krew jak najszybciej odwirować i oddzielić surowicę od krwinek.
Lamotrygina w surowicy	
Lewetyracetam w surowicy	
Wolna hemoglobina w surowicy	- Sugerowane jest pobieranie krwi systemem otwartym. - Krew należy pobierać igłą o dużej średnicy powoli odciągając tłok strzykawki. - Krew delikatnie przelać do probówki (nie używając igły). - Nie mieszać i nie wstrząsać probówki. - Probówkę odstawić do wykrzepiania w pozycji pionowej.